

Предназначение	Рекомендации по применению
Для профилактики дефицитов серебра, в комплексной профилактике атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой системы	Взрослым принимать по 15 капель (1/2 ч.л.) 2 раза в день между приемами пищи в течение 10-30 дней (для оптимального всасывания можно подержать в полости рта 3-4 минуты). Можно разводить в воде.
Для снижения активности хронического воспаления при заболеваниях мочевыделительной системы	Взрослым принимать по 15 капель (1/2 ч.л.) 2 раза в день между приемами пищи в течение 10-30 дней (для оптимального всасывания можно подержать в полости рта 3-4 минуты). Можно разводить в воде.
Для снижения активности хронического воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей	Взрослым принимать по 15 капель (1/2 ч.л.) 2 раза в день между приемами пищи в течение 10-30 дней (для оптимального всасывания можно подержать в полости рта 3-4 минуты). Можно разводить в воде.
В комплексном лечении острых кишечных инфекций в качестве антисептического и вяжущего средства	Взрослым принимать по 1 ч.л. 2 раза в день между приемами пищи в течение 10-30 дней (для оптимального всасывания можно подержать в полости рта 3-4 минуты). Можно разводить в воде.
Наружно для обработки поверхности кожи для обработки ран, порезов, гиперемии при укусах насекомых	Орошение кожи, слизистых, увлажнение повязок, смачивание тампонов. При ранах обрабатывать очаги поражения 3-4 раза в сутки.

Наружно для обработки поверхности слизистых оболочек полости рта для снижения количества патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; уменьшения неприятного запаха из ротовой полости при наличии виниров, съемных и несъемных протезов

Орошение слизистых оболочек ротовой и полости носа 3-4 раза в сутки.