

## ХондроАП, 60 капс.

**Состав:** глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат.

<b>Предназначение</b>	<b>Рекомендации по применению</b>
Дополнительный источник глюкозамина сульфата, хондроитина сульфата	Взрослым по 2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости курс можно повторить.
Для стимулирования синтеза глюкозаминогликанов, нормализации метаболизм гиалиновой ткани, способствует регенерации хрящевых поверхностей и суставной сумки	Взрослым по 2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости курс можно повторить.
Для уменьшения болезненности суставов, боли в состоянии покоя и при ходьбе, выраженность воспаления	Взрослым по 2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости курс можно повторить.
Для замедления резорбции костной ткани, ускорения процессов репарации костной ткани, торможения прогрессирования остеоартроза	Взрослым по 2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости курс можно повторить.
Для профилактики остеоартроза	Взрослым по 2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема - 2-3 месяца. При необходимости курс можно повторить.
Для профилактики оксидантных нарушений	Взрослым по 2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема - 2-3 месяца. При необходимости курс можно повторить.
Для нормализации метаболизма кальция в костной ткани	Взрослым по 2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости курс можно повторить.



## ХондроАП, 60 капс.

Профилактика остеоартрита при сахарном диабете 2 типа	Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 месяца или до достижения ремиссии.
В профилактике и комплексном лечении аденомы, колоректального рака и рака легких	Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 месяца. При необходимости курс можно повторить.
Для снижения риска нейровоспаления и развития болезни Альцгеймера и сосудистой деменции	Взрослым по 1-2 капсулы 2-3 раза в день в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 месяца или до стабилизации состояния.
В профилактике и комплексном лечении возрастной макулярной дегенерации	Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 месяца или до стабилизации состояния.

